



Riscos potenciais dos alinhadores ortodônticos:

Como em outros tipos de tratamentos ortodônticos, os alinhadores podem conter alguns dos riscos potenciais descritos abaixo:

- O tempo de tratamento poderá exceder as estimativas. Baixa colaboração e comprometimento em relação às instruções do vosso Médico Dentista, como por exemplo: usar os alinhadores menos de 22 horas por dia, falta de consultas de acompanhamento, crescimento ósseo excessivo, má higiene oral e alinhadores danificados ou perdidos podem prolongar o tempo de tratamento, aumentar o custo do tratamento e poderá alterar a qualidade dos resultados finais.
- Dentes de formato incomum também podem prolongar o tempo de tratamento e afetar os resultados. Por exemplo, coroas clínicas curtas podem causar problemas de retenção do alinhador e retardar ou impedir o movimento dos dentes.
- A cárie dentária, a doença periodontal, a descalcificação (marcas permanentes nos dentes) ou a inflamação das gengivas podem ocorrer se a higiene oral e a manutenção preventiva não são mantidas, seja com alinhadores ou não.
- Feridas e irritação do tecido mole da boca (gengivas, bochechas, língua e lábios) são possíveis, mas raramente ocorrem devido ao uso de alinhadores.



Termo de consentimento informado uso de Alinhadores Ortodônticos

- Inicialmente, os alinhadores podem afetar temporariamente a sua fala. Os pacientes geralmente se adaptam rapidamente ao uso de alinhadores e é raro que a fala seja prejudicada por um longo período de tempo.
- Ao usar alinhadores, você pode experimentar um aumento temporário na salivagem ou ressecamento da boca. Certos medicamentos podem aumentar isso.
- Pode ser necessário colocar temporariamente nos dentes *attachments* (pequenas saliências de resina) para auxiliar nos movimentos ortodônticos mais difíceis. Quando não estiver usando esses *attachments* poderão ser sentidos desconfortáveis na boca.
- Em casos de apinhamento, pode ser necessário criar espaço para permitir o movimento dos dentes através de desgaste interproximal de alguns dentes (reduzindo a espessura do esmalte de um dente).
- Quaisquer medicamentos que esteja tomando e sua condição médica geral podem afetar seu tratamento ortodôntico. Relate sempre ao vosso Médico Dentista.
- Embora incomum, reações alérgicas ao material usado durante o tratamento podem ocorrer. Se você acredita que está passando por uma reação, informe o vosso Médico Dentista imediatamente.
- A sensibilidade dentária e a sensibilidade da boca podem ocorrer durante o tratamento - especialmente ao avançar de um alinhador para o seguinte (Avançar as etapas do tratamento).



Termo de consentimento informado uso de Alinhadores Ortodônticos

- Os ossos e gengivas, que suportam os dentes, podem ser afetados pelo uso de alinhadores. Em alguns casos, sua saúde pode ser prejudicada ou piorada.
- A cirurgia oral pode ser necessária para corrigir o apinhamento excessivo ou desequilíbrios mandibulares graves e pré-existentes. Todos os riscos de cirurgia oral, como aqueles associados com anestesia e cicatrização adequada, devem ser considerados antes do tratamento.
- O uso de alinhadores pode agravar os dentes - previamente traumatizados ou não. Embora seja uma ocorrência rara, esses dentes podem exigir tratamento dentário, como tratamento endodôntico ou outro tratamento restaurador, a vida útil dos dentes pode ser encurtada, ou os dentes podem ser perdidos completamente.
- As restaurações dentárias existentes, como coroas e pontes, podem ser afetadas pelo uso de alinhadores. Eles podem se desalojar e exigir re-cimentação ou, em alguns casos, substituição. Antes de quaisquer restaurações dentárias serem substituídas ou adicionadas, consulte vosso Médico Dentista se poderá afetar os alinhadores;
- Os dentes podem supra-erupcionar / extruir (sair das gengivas mais do que os outros dentes) se não estiverem parcialmente cobertos pelo alinhador.
- A reabsorção da raiz (encurtamento) pode ocorrer durante qualquer tipo de tratamento ortodôntico, incluindo alinhadores. Raízes encurtadas não são



Termo de consentimento informado uso de Alinhadores Ortodônticos
desvantagem em condições saudáveis. Em casos raros, a reabsorção radicular
poderá resultar em perda de dentes.

- Em casos de apinhamento severo ou múltiplos dentes ausentes, é mais provável que o alinhador possa quebrar. Contacte o vosso Médico Dentista assim que possível.
- Como os aparelhos ortodônticos são usados na boca, acidentalmente engolir ou aspirar - no todo ou em parte - o alinhador, pode ocorrer.
- Embora raros, podem ocorrer problemas na articulação da mandíbula, causando dor nas articulações, desconforto, dores de cabeça ou problemas no ouvido. Informe o vosso Médico Dentista de quaisquer desses problemas imediatamente.
- Alinhadores desgastados de sua sequência pretendida podem atrasar os resultados do tratamento e resultar em complicações, incluindo (mas não se limitando a) desconforto do paciente. Use sempre alinhadores na ordem especificada pelo vosso Médico Dentista.
- Em alguns casos, um “triângulo preto” de tecido gengival ausente pode ser visível abaixo do contato interproximal quando os dentes são movimentados e sobrepostos por um longo período de tempo.
- Poderá haver recidiva se o uso adequado da contenção e as instruções do vosso Médico Dentista não forem seguidas, após a finalização do tratamento ortodôntico.



Termo de consentimento informado uso de Alinhadores Ortodônticos

• Um tratamento com resultado final bem sucedido não pode ser garantido. Depois que os alinhadores finais planejados forem enviados, alguns casos podem exigir

refinamento com alinhadores adicionais, técnicas ortodônticas tradicionais e / ou procedimentos cosméticos como coroas ou facetas para atingir resultados ideais. Pode haver custos adicionais se você precisar de tais procedimentos. Siga sempre as instruções de uso (incluído com cada pacote de alinhador) para melhores resultados.

Assinatura do Paciente

Assinatura do paciente ou pai / guardião (se o paciente for menor)

Assinatura do Médico Dentista

Local:

Data: / / . Horário: